

# 感 染 症 週 報

## 島しょ保健所八丈出張所管内感染症発生動向調査

管内15週

( 4月7日 ~ 4月13日 )

東京都感染症週報 より抜粋

14週

( 3月31日 ~ 4月6日 )

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/weekly/>

東京都インフルエンザ情報

第28号

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/assets/flu/2024/Vol27No28.pdf>



東京都島しょ保健所八丈出張所

〒100-1511

東京都八丈島八丈町三根1950番地2

TEL : 04996-2-1291

FAX : 04996-2-0632

<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tousyo/hachijou/index.html>

# 感染症週報

八丈出張所管内の感染症流行情報

(八丈町・青ヶ島村)

第14・15週(3/31~4/6 4/7~4/13)  
八丈出張所管内 感染性胃腸炎1件 RSウイルス感染症3件

## 感染性胃腸炎,RSウイルス感染症にご注意ください！


★八丈出張所管内で第14週に感染性腸炎が1件、第15週にRSウイルス報告が3件（前週0件）報告がありました。

★東京都全体では感染性腸炎2057件、RSウイルス136件でした。（第14週）

### 注目される定点把握対象疾患

#### — RSウイルス感染症 —

右の図は、東京都のRSウイルス感染症の流行状況マップです。豊島区、足立区、北区、荒川区、江戸川区、大田区、八王子市が他の地区と比較して高くなっております。



### ひとくち感染症情報「RSウイルス感染症」

#### どんな病気？

RSウイルスによる呼吸器感染症です。1歳までに50~70%以上が感染し、2歳までにはほぼすべての小児が少なくとも一度は感染すると言われております。症状は軽い風邪様症状から重い肺炎まで様々ですが、乳児期早期（生後数週間~数カ月間）にRSウイルスに初感染した場合、細気管支炎、肺炎を引き起こすことがあり、特に低出生体重児や心臓や肺に基礎疾患がある場合は重症化のリスクが高いです。また、頻度は少ないですが重篤な合併症として脳症があります。RSウイルスは生涯にわたって感染を繰り返すので、幼児期における再感染での発症はよくみられますが、その多くは軽い症状です。治療は解熱薬の投与や水分補給などの対症療法が主となります。

#### どうやってうつるの？

RSウイルス感染症は、ウイルスに感染している人の咳やくしゃみ、又は会話のときに飛び散るしぶきを吸い込んで起こる飛まつ感染と、ウイルスがついている手指や物品（ドアノブ、手すり、スイッチ、机、椅子、おもちゃ、コップ等）を触ったり、なめたりすることで起こる接触感染があります。

#### どうやって防ぐの？

咳などの呼吸器症状がある年長児や大人は、可能な限り0歳児から1歳児との接触を避けることが乳幼児の発症予防に繋がります。接触感染の予防は、子どもたちが日常的に触れるおもちゃや手すりなどをこまめにアルコール又は塩素系の消毒剤などで消毒することと、流水と石鹸による手洗いが重要です。また、咳などの症状がある場合にはマスクを着用するなどの咳エチケットが有効です。



引用：東京都健康安全研究センターRSウイルス感染症リーフレット

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/diseases/rs-virus/hitokuchi-joho.pdf?20230622>

厚生労働省RSウイルス感染症Q&A