



新型コロナウイルス感染症…五類感染症

資料1
-今後注意が必要な感染症-

東京都の状況（令和7年第23週：6月2日～6月8日）



※1 定点医療機関からの報告に基づく値（当該週の報告患者数／報告医療機関数）

（注）令和5年第19週から集計開始

※2 入院基幹定点医療機関からの報告に基づく値（当該週の入院患者数／報告医療機関数）

（注）令和5年第39週から集計開始

全国の状況（第22週）

【定点医療機関当たりの患者報告数 全国の平均】

0.84人/定点（前週：0.84人/定点）

【前週より増加している自治体】

21自治体（前週：12自治体）

【前週より減少している自治体】

26自治体（前週：34自治体）

都民への呼びかけ

○ 例年、夏季と冬季に患者報告数が増加。昨夏は、7月中旬から下旬にかけてピーク


○ 換気、手洗い、場面に応じたマスク着用などの心がけを

ヘルパンギーナ …五類感染症

－ 今後注意が必要な感染症－

都内における定点（小児科）あたりの週別患者報告数

2025年のデータは、6月8日（第23週）まで



現在の状況

- 例年6月頃から流行し、夏にピークを迎える
- 今年は第23週時点で定点あたり0.13人でほぼ平年並み

症状等

「エンテロウイルス属」による咽頭炎（飛沫感染、接触感染）

- 38度以上の突然の発熱に続き、口の中にできる水疱が1週間程度続く


都民への呼びかけ

- 原因となるウイルスはアルコールに抵抗があるため、石けんでの手洗いが有効
- 痛みにより食事や水分がとりにくくなるため、脱水症状に注意

水痘(みずぼうそう) …五類感染症

— 今後注意が必要な感染症 —

都内における定点(小児科)あたりの週別患者報告数



現在の状況

- 今年は第17週時点で6年ぶりに注意報基準を超過
- その後、注意報基準を下回ったものの、第22週で再び注意報基準を超過

<水痘の注意報の基準> 以下の①か②に該当した場合

- ① 定点医療機関からの患者報告数が都全体で基準値(1.0人)を超えた場合
- ② 注意報レベルにある保健所の管内人口の合計が東京都全体人口の30%を超えた場合

症状等


水痘・帯状疱疹ウイルスによる感染症 (空気感染、飛沫感染、接触感染)

- 特徴的な症状は水疱(水ぶくれ)と発熱で、全身に赤い発しんが出現する


都民への呼びかけ

- 最も有効な予防策はワクチン接種
- 1歳を迎えたら速やかに定期接種を受けることをご検討ください

麻疹発生届数の推移(全国・東京都)



推定感染地域別麻疹報告数(全国) 2025年第1～22週 (n=129)



推定感染地域「国外」および「国内または国外」の
主な国別報告数

ベトナム : 51、タイ : 3、フィリピン : 2、
モンゴル : 1、パキスタン : 1 など

現在の状況

- 麻疹の世界的な流行により、輸入例が増加している
- 海外渡航歴のない国内感染例や、輸入例を起点とした集団感染例の報告がある

症状等

- 発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血など
- 感染力は非常に強く、免疫をもたない人が感染するとほぼ100%発症する
- 重症化すると肺炎や脳炎等の合併症を発症することもある

● 国は、麻しんのまん延防止のため1期、2期それぞれの接種率を**95%以上**となることを目標としている(国の麻しんに関する特定感染症予防指針)

東京都	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
MR第1期	96.7%	98.5%	95.1%	96.5%	96.4%
MR第2期	92.3%	93.4%	93.2%	91.8%	91.5%

- 都のホームページ、SNS(X、LINE)を通じて呼びかけ
- 多言語リーフレットを作成

- ◆ 2回の麻しん風しん定期接種を忘れずに受けましょう
- ◆ これまで麻しんに感染したことがなく、ワクチンを2回接種していない方は、抗体検査やワクチン接種をご検討ください
- ◆ 発熱や発しんなど、麻しんを疑う症状や不安のある方は、事前にかかりつけ医等にご連絡のうえで、公共交通機関の利用を控えて受診してください

＜ベトナム語リーフレット＞

Thông tin bổ sung về bệnh truyền nhiễm

Thứ 6 ngày 1 tháng 5 năm 2020
Trung tâm nghiên cứu an toàn sức khỏe

Hãy chú ý đến bệnh sởi!

☑ Là bệnh như thế nào?

- Là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus sởi. Trong tiếng Nhật gọi là "measles" hoặc "mù sởi".
- Khả năng lây nhiễm rất mạnh mẽ, và nếu người chưa có hệ miễn dịch hoặc uống vắc xin phòng ngừa 100% sẽ phát sinh triệu chứng.
- Nếu phát sinh triệu chứng sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, phát ban, ho, sổ mũi, v.v.
- Nếu trở nặng có thể sẽ phát sinh các biến chứng như viêm phổi hay viêm não, v.v.
- Các đoạn tin nhắn (giao đoạn tin nhắn miễn dịch khi phát sinh triệu chứng) khoảng 10 ngày, gây nguy hiểm (giao đoạn tin nhắn có khả năng lây nhiễm có nguy cơ bùng phát) là trong khoảng thời gian từ 1 ngày trước khi phát sinh triệu chứng cho đến 3 ngày sau khi ra sốt.

☑ Làm thế nào để không mắc bệnh sởi?

- Vào các cơ sở y tế trong việc phòng bệnh. Xin hãy kiểm tra lịch sử tiêm chủng bằng bộ M và B6, v.v.
- Đối với người ở độ tuổi đi đến các khu vực bệnh đang phát triển nhưng không thể kiểm tra được lịch sử tiêm chủng, hãy tham gia tư vấn để tạo điều kiện cho số y tế và việc tiêm vắc xin (các cơ sở y tế được chỉ định khu vực này để được kiểm tra).

Hiện nay, tỷ lệ nhiễm được xác định dựa trên tình hình tiêm chủng của các quốc gia trong nước như sau:

Quốc gia / Khu vực	Tỷ lệ nhiễm (%)
Thái Lan (Thailand)	~35%
Philippines	~25%
Myanmar	~20%
Myanmar	~15%
Japan	~5%

- Nhật Bản (3%)
- Thái Lan (3%)
- Philippines (2%)
- Các nước khác (2%)
- Trung Quốc (1%) (2%)

Liên hệ từ 1 tuần từ 10 năm 2020 (ngày 10 tháng 12)
2020 - ngày 20 tháng 1 năm 2021
Tỷ lệ nhiễm từ 10 năm 2020 (ngày 10 tháng 12)

Các thông tin chi tiết về bệnh sởi và các biện pháp phòng ngừa có thể tìm thấy ở đây.

Trung tâm nghiên cứu an toàn sức khỏe và phòng ngừa bệnh nhân (M&P)
Trung tâm nghiên cứu an toàn sức khỏe và phòng ngừa bệnh nhân (M&P)
© 2020 Measles (Bệnh sởi) và các biến chứng

Xin hãy chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân
trong khoảng 2 tuần sau khi trở về Nhật.

☑ Nếu nghĩ rằng có thể đã mắc bệnh sởi thì?


- Xin hãy báo cáo với cơ sở y tế qua điện thoại rồi đến khám.
- Xin hãy hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong quá trình có triệu chứng.
- Xin hãy đeo khẩu trang.

☑ Nếu được chẩn đoán mắc bệnh sởi thì?

- Xin hãy hạn chế ra ngoài để không phát tán vi khuẩn cho những người xung quanh.
- Tránh xa trẻ gần khu vực sinh sống để ngăn chặn bệnh, nên xin nghỉ học các trường việc khác.

侵襲性髄膜炎菌感染症 …五類感染症 - 今後注意が必要な感染症-

東京都の侵襲性髄膜炎菌感染症発生件数(2006年～2025年)



すでに2024年と同数発生

現在の状況

- 4年連続で増加傾向で、2025年はすでに2024年と同数発生
- 東京都健康安全研究センターにて分子疫学調査を実施

症状等

- 頭痛、発熱、吐き気などの症状を呈し、急速に進行する場合がある
- 重症になると意識障害やけいれんが起こることもある
- イベント、寮など人が集まる場所での飛まつ感染・接触感染による集団発生の報告がある

都民への呼びかけ


- 都民向けリーフレットを更新、都のホームページへ掲載
- マスク着用やこまめな手洗いなど、基本的な感染対策を心がけましょう
- 大人数での飲み物の回し飲みや、食器の共用は避けましょう



梅毒 …五類感染症

- 今後注意が必要な感染症 -

東京都の感染状況(年報) 報告数(件)



東京都の感染状況の推移 報告数(件)

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
感染報告数	1,579	2,451	3,677	3,701	3,760
10歳代	27	63	113	115	140
20・30歳代	1,008	1,652	2,338	2,222	2,285
HIV合併	273	272	242	258	299
妊娠合併	23	26	62	76	90
先天梅毒	2	3	0	9	5


都における発生動向等

- 梅毒は、前年まで4年連続で増加し、今年も感染の拡大が続いている
- 感染が多い20歳代、30歳代のほか、10歳代の増加、妊娠合併事例、先天梅毒が顕著

症状等


- 性器、口など感染した部位にできもの、しこり、ただれなどが出る。その後、手のひらや足の裏など全身に淡い赤色の発疹が出る。いずれも治療しなくても自然に消え、感染に気付かず病気が進行する。

匿名・無料検査件数の推移



■ 都内保健所検査件数 ■ 新宿東口検査件数 ■ 多摩地域検査件数

都及び保健所の相談件数の推移



■ 東京都エイズ電話相談 ■ 区保健所 ■ 都保健所

梅毒の検査・相談状況

- 都内の匿名・無料検査件数はコロナ禍以降、大幅に増加
- 保健所等への相談件数は2022年から2年連続増加、2024年は横ばい

都の取り組み

- **検査・相談体制の確保**
- **人の流れが活発な夏に集中的な普及啓発を実施**
 - ・ 多様な出会いを踏まえた若年層向けSNS広告(X、Instagram、Facebook等)
 - ・ 地域イベントで青少年、若年層向け啓発ブースの出展
- **都立高校、区市町村の母子保健部門に対する講習の実施**