

1 目的

説明変数に欠損値を1つも含まない認定患者のデータを用いて、喘息重症度に及ぼす因子を探索することが目的である。

2 対象

令和元年度認定患者 19歳以下 1,498人 20歳以上 19,651人
 令和2年度認定患者 19歳以下 1,119人 20歳以上 16,488人

3 方法

喘息重症度が軽症か、重症かに対して、どのような因子が影響を与える可能性があるかを調べるため、多重ロジスティック回帰分析を適用させた。変数の選択は、p値を用いたステップワイズの変数選択（減少法）を行った。

4 解析

(1) 喘息重症度を2群に分けて解析

軽症間欠型+軽症持続型+中等症持続型 = 0
 重症持続型+最重症持続型 = 1

(2) 以下の因子についてロジスティック回帰分析に組み込むべきかの選別を行った。認定年度ごと、19歳以下及び20歳以上別に因子の選別を行った。

因子		
性別	女=0、男=1	
小児期の喘息既往(15歳以下発症)	なし=0、あり=1	20歳以上のみ
本人の喫煙歴	なし=0、あり=1	20歳以上のみ
自宅や職場などでの受動喫煙の機会(※1)	なし=0、あり=1	
本人のアレルギー疾患合併症(※2)	なし=0、あり=1	
父のアレルギー疾患(※2)	なし=0、あり=1	
母のアレルギー疾患(※2)	なし=0、あり=1	
兄弟姉妹のアレルギー疾患(※2)	なし=0、あり=1	
ペット(イヌ)	なし=0、あり=1	
ペット(ネコ)	なし=0、あり=1	
ペット(ハムスター)	なし=0、あり=1	
ペット(ウサギ)	なし=0、あり=1	
ペット(その他)	なし=0、あり=1	
1歳までのペット	なし=0、あり=1	

(※1)自宅や職場などでの受動喫煙の機会は、1ほぼ毎日、2ときどきあったを(あり=1)、3ほとんどない・まったくないを(なし=0)とした。

(※2)アレルギー疾患は、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性結膜炎の疾患別に選別をおこなった。

5 結果

4(2)の結果により選別された因子を説明変数とし、ロジスティック回帰分析を行った。

(1) 19歳以下

○令和元年度認定患者

因子	係数	標準誤差	p 値	オッズ比	95%信頼区間
切片	-2.726	0.519			
受動喫煙	0.692	0.238	0.002	2.040	1.29-3.23
合併症（食物アレルギー）	0.433	0.229	0.031	1.630	1.05-2.55
合併症（アレルギー性鼻炎）	-0.553	0.232	0.007	0.542	0.35-0.85

○令和2年度認定患者

因子	係数	標準誤差	p 値	オッズ比	95%信頼区間
切片	-3.598	0.715			
家族歴（父・アトピー性皮膚炎）	1.143	0.296	<0.001	3.080	1.74-5.43
家族歴（母・アレルギー性鼻炎）	-0.578	0.253	0.022	0.562	0.34-0.92
現在ペット（ネコ）	1.083	0.446	0.009	3.130	1.33-7.40

(2) 20歳以上

○令和元年度認定患者

因子	係数	標準誤差	p 値	オッズ比	95%信頼区間
切片	-2.093	0.101			
年齢	0.011	0.001	<0.001	1.010	1.01-1.01
小児期の喘息既往	-0.153	0.050	0.003	0.859	0.78-0.95
合併症（アトピー性皮膚炎）	0.105	0.049	0.021	1.120	1.02-1.23
合併症（アレルギー性鼻炎）	-0.089	0.043	0.013	0.907	0.84-0.98
1歳までのペット飼育	0.089	0.047	0.037	1.100	1.01-1.21

○令和2年度認定患者

因子	係数	標準誤差	p 値	オッズ比	95%信頼区間
切片	-2.138	0.110			
年齢	0.012	0.002	<0.001	1.010	1.01-1.02
小児期の喘息既往	-0.166	0.054	0.002	0.845	0.76-0.94
受動喫煙	0.105	0.041	0.008	1.110	1.03-1.21
家族歴（母・気管支喘息）	0.179	0.071	0.009	1.200	1.05-1.38
合併症（食物アレルギー）	0.275	0.054	<0.001	1.310	1.19-1.46
合併症（アレルギー性鼻炎）	-0.097	0.043	0.023	0.909	0.84-0.99