

患者データ解析用重症度換算表（15歳以下）

		治療ステップ			
		治療ステップ1	治療ステップ2	治療ステップ3	治療ステップ4
	気管支喘息 小児（15歳以下）の重症度分類	吸入ステロイドの使用なし かつ 経口ステロイド（維持）の使用なし かつ 抗IgE抗体の使用なし	吸入ステロイド（ 低用量 ）の使用有 かつ 経口ステロイド（維持）の使用なし かつ 抗IgE抗体の使用なし	吸入ステロイド（ 中用量 ）の使用有 かつ 経口ステロイド（維持）の使用なし かつ 抗IgE抗体の使用なし	下記のうちいずれか1つ以上を満たす ①吸入ステロイド（ 高用量 ）の使用有 ②経口ステロイド（維持）の使用有 ③抗IgE抗体の使用有
最近1年間の症状	間欠型 1. なし 2. 年に数回	間欠型	軽症持続型	中等症持続型	重症持続型
	軽症持続型 3. 1回/月以上、1回/週末未満	軽症持続型	中等症持続型	重症持続型	重症持続型
	中等症持続型 4. 1回/週以上、1回/日未満	中等症持続型	重症持続型	重症持続型	最重症持続型
	重症持続型 5. 毎日/生活に制限なし 6. 毎日/生活に制限あり	重症持続型	重症持続型	重症持続型	最重症持続型

* 最重症持続型を区別できる分類とした。

患者データ解析用重症度換算表（16歳以上）

		治療ステップ（治療ステップの分類については別紙参照）			
		治療ステップ1	治療ステップ2	治療ステップ3	治療ステップ4
	気管支喘息 成人（16歳以上）の重症度分類				
最近1年間の症状	コントロールされた状態及び軽症間欠型相当 1. なし 2. 年に数回 3. 1回/月以上、1回/週末未満	軽症間欠型	軽症持続型	中等症持続型	重症持続型
	軽症持続型相当 4. 1回/週以上、1回/日未満	軽症持続型	中等症持続型	重症持続型	重症持続型
	中等症持続型相当 5. 毎日/生活に制限なし	中等症持続型	重症持続型	重症持続型	最重症持続型
	重症持続型相当 6. 毎日/生活に制限あり	重症持続型	重症持続型	重症持続型	最重症持続型

* 最重症持続型を区別できる分類とした。