

5 結核

長引くせきは結核かも

1 病原体名

結核菌

2 年齢層

全年齢

3 潜伏期間

数か月から数年


4 症状と決まりごと

- ✓ 感染していても発病しなければ、周囲へ感染しません。
- ✓ 発病した初期は無症状で、健康診断の時に胸部レントゲンで偶然発見されることもあります。
- ✓ 2週間以上の長引くせき、たん、微熱、けん怠感、夜間の寝汗などが出ます。血が混じったたんや、食欲不振、体重減少が見られることもあります。
- ✓ 医師が感染の恐れがないと認めるまで学校へは出席停止です。
- ✓ たんの中に結核菌が見つかったら、保健所から連絡が

入り、結核専門病院に入院することになります。また、保健所が健診を行い他の感染者を発見します。

5 診断と治療

- ☑ たんの検査や胸部レントゲンで診断します。
- ☑ 抗結核薬による治療を通常6～9か月間行います。
- ☑ 自己判断で薬を中断すると、薬が効かない耐性菌になる可能性があります。薬は最後まで飲み続けましょう。



6 周囲に広げないために

- ☑ 感染経路は空気感染です。感染者と同じ空間に長時間いると、感染する危険性が高まります。
- ☑ 胸部レントゲンの定期健診で早期に発見して治療を始めることで、周りの人に感染させる可能性がとて低くなります。
- ☑ 乳児には、重症化を防ぐためにBCGの定期接種が行われています。ただし感染を防ぐことはできません。

