

※これは実際にはない薬です。

くすりの薬を飲むときは、この説明書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう保存しておいてください。

のりもののるんジュニア

 使用上の注意(薬を飲むときに気をつけること)

 してはいけないこと

- この薬を飲んでいるときは、ほかのよい止め薬やアレルギー薬、かぜ薬を飲まないでください。
- この薬を飲んだ後は、自転車などの乗り物の運転操作をしないでください。

相談すること

- 医師の治療を受けている人や、薬などでアレルギーを起こしたことがある人は薬を飲む前に医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。
- この薬を飲んだ後、次の症状があらわれたときは副作用の可能性があるので、すぐに飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

からだの部位	症状
ひふ	かゆみ、ほっしん(ぶつぶつ)
じゅんかんき	どうき
ひにようき	尿がでにくい

- この薬を飲んだ後、口のかわきやねむけがあらわれることがあるので、このような症状が長く続いたり、強くなった場合には、薬を飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

こうのうくすりこうか
効能(薬の効果)

のりもの乗り物よいによるめまい、はきけ、頭痛を予防したり、やわらげます。

ようほうようりよう
用法・用量

のりもの乗り物よいの予防には、乗り物に乗る30分前に、下の1回量を水かぬるま湯で飲んでください。

ねんれい 年齢	かい の りよう 1回に飲む量	ようほう ようりよう 用法・用量についての注意
さい さい 11才～14才	じょう 2錠 ⊗ ⊗	• 1日3回まで。 • 薬を飲んだ後、次にこの薬を飲むまで4時間以上あけてください。
さい さい 5才～10才	じょう 1錠 ⊗	
さい み まん 5才未満	の 飲まないでください。	