



ど くすり
よい止めの薬を

ただ つか
正しく使おう





くすり せつめいしょ

薬の説明書を

よ

読んだことはありますか？



※これは実際にはない薬です。

薬を飲むときは、この説明書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう保存しておいてください。

のりもののるんジュニア

 使用上の注意(薬を飲むときに気をつけること)

してはいけないこと

1. この薬を飲んでいるときは、ほかのよい止め薬やアレルギー薬、かぜ薬を飲まないでください。
2. この薬を飲んだ後は、自転車などの乗り物の運転操作をしないでください。

相談すること

1. 医師の治療を受けている人や、薬などでアレルギーを起こしたことがある人は薬を飲む前に医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。
2. この薬を飲んだ後、次の症状があらわれたときは副作用の可能性があるので、すぐに飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

からだの部位	症状
ひふ	かゆみ、ほっしん(ぶつぶつ)
じゅんかんき	どうき
ひにようき	尿が出にくい

3. この薬を飲んだ後、口のかわきやねむけがあらわれることがあるので、このような症状が長く続いたり、強くなった場合には、薬を飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。


こうのうくすりこうか 効能(薬の効果)

乗り物よいによるめまい、はきけ、頭痛を予防したり、やわらげます。

ようほうようりよう 用法・用量

乗り物よいの予防には、乗り物に乗る30分前に、下の1回量を水かぬるま湯で飲んでください。

ねんれい 年齢	かい の かず 1回に飲む数	ようほう・ようりょう 用法・用量についての注意
11才～14才	2錠 ⊗ ⊗	・1日3回まで。 ・薬を飲んだ後、次にこの薬を飲むまで4時間以上あけてください。 飲まないでください。
5才～10才	1錠 ⊗	
5才未満		



くすり の

薬を飲むときのルール



の じかん
・ 飲む時間 = 用法

の かず りょう
・ 飲む数、量 = 用量

※これは実際にはない薬です。

薬を飲むときは、この説明書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう保存しておいてください。

のりもののるんジュニア

 使用上の注意(薬を飲むときに気をつけること)

してはいけないこと

1. この薬を飲んでいるときは、ほかのよい止め薬やアレルギー薬、かぜ薬を飲まないでください。
2. この薬を飲んだ後は、自転車などの乗り物の運転操作をしないでください。

相談すること

1. 医師の治療を受けている人や、薬などでアレルギーを起こしたことがある人は薬を飲む前に医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。
2. この薬を飲んだ後、次の症状があらわれたときは副作用の可能性があるので、すぐに飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

からだの部位	症状
ひふ	かゆみ、ほっしん(ぶつぶつ)
じゅんかんき	どうき
ひにようき	尿が出にくい

3. この薬を飲んだ後、口のかわきやねむけがあらわれることがあるので、このような症状が長く続いたり、強くなった場合には、薬を飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

こうのうくすりこうか 効能(薬の効果)


乗り物よいによるめまい、はきけ、頭痛を予防したり、やわらげます。

ようほうようりよう 用法・用量

乗り物よいの予防には、乗り物に乗る30分前に、下の1回量を水かぬるま湯で飲んでください。

ねんれい 年齢	かい の かい 1回に飲む数	ようほう・ようりょう 用法・用量についての注意
11才～14才	2錠 ⊗ ⊗	・1日3回まで。 ・薬を飲んだ後、次にこの薬を飲むまで4時間以上あけてください。 飲まないでください。
5才～10才	1錠 ⊗	
5才未満		

たいない くすり うご
体内の薬の動き



しょくどう
食道

かんぞう
肝臓


い
胃

だいちょう
大腸

しょうちょう
小腸

みぎ たいない かんいてき
右のイラストは体内を簡易的にあらわしたものです。

ど くすり の もの の
このよい止めの薬は乗り物に乗る
ぶんまえ の
30分前に飲みましょう！



※これは実際にはない薬です。

薬を飲むときは、この説明書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう保存しておいてください。

のりものるんジュニア

 使用上の注意(薬を飲むときに気をつけること)

してはいけないこと

1. この薬を飲んでいるときは、ほかのよい止め薬やアレルギー薬、かぜ薬を飲まないでください。
2. この薬を飲んだ後は、自転車などの乗り物の運転操作をしないでください。

相談すること

1. 医師の治療を受けている人や、薬などでアレルギーを起こしたことがある人は薬を飲む前に医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。
2. この薬を飲んだ後、次の症状があらわれたときは副作用の可能性があるので、すぐに飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

からだの部位	症状
ひふ	かゆみ、ほっしん(ぶつぶつ)
じゅんかんき	どうき
ひにようき	尿が出にくい

3. この薬を飲んだ後、口のかわきやねむけがあらわれることがあるので、このような症状が長く続いたり、強くなった場合には、薬を飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

こうのうくすりこうか 効能(薬の効果)

乗り物よいによるめまい、はきけ、頭痛を予防したり、やわらげます。

ようほうようりよう 用法・用量

乗り物よいの予防には、乗り物に乗る30分前に、下の1回量を水かぬるま湯で飲んでください。

ねんれい 年齢	かい の かず 1回に飲む数	ようほう・ようりょう 用法・用量についての注意
さい さい 11才～14才	2錠 ⊗ ⊗	・1日3回まで。 ・薬を飲んだ後、次にこの薬を飲むまで4時間以上あけてください。
さい さい 5才～10才	1錠 ⊗	
さいみん 5才未満	飲まないでください。	

ふくさよう き
副作用って聞いたことが
ありますか？



くすり

さよう

薬の2つの作用

しゅさよう くすり の もくてき はたら

主作用：薬を飲む目的の働き

の もの よぼう の もの しょうじょう

→ 乗り物よいの予防、乗り物よいの症状をやわらげる

ふくさよう くすり の もくてき

副作用：薬を飲む目的ではない好ましくない働き

くち

→ ねむけ、口のかわき、かゆみ、ほっしん（ぶつぶつ）

※これは実際にはない薬です。

薬を飲むときは、この説明書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう保存しておいてください。

のりもののるんジュニア

 使用上の注意(薬を飲むときに気をつけること)

してはいけないこと

1. この薬を飲んでいるときは、ほかのよい止め薬やアレルギー薬、かぜ薬を飲まないでください。
2. この薬を飲んだ後は、自転車などの乗り物の運転操作をしないでください。

相談すること

1. 医師の治療を受けている人や、薬などでアレルギーを起こしたことがある人は薬を飲む前に医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。
2. この薬を飲んだ後、次の症状があらわれたときは副作用の可能性があるので、すぐに飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

からだの部位	症状
ひふ	かゆみ、ほっしん(ぶつぶつ)
じゅんかんき	どうき
ひにようき	尿が出にくい

3. この薬を飲んだ後、口のかわきやねむけがあらわれることがあるので、このような症状が長く続いたり、強くなった場合には、薬を飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

こうのうくすりこうか 効能(薬の効果)

乗り物よいによるめまい、はきけ、頭痛を予防したり、やわらげます。

ようほうようりよう 用法・用量

乗り物よいの予防には、乗り物に乗る30分前に、下の1回量を水かぬるま湯で飲んでください。

ねんらい 年齢	かい の かず 1回に飲む数	ようほう・ようりょう 用法・用量についての注意
11才～14才	2錠 ⊗ ⊗	・1日3回まで。 ・薬を飲んだ後、次にこの薬を飲むまで4時間以上あけてください。 飲まないでください。
5才～10才	1錠 ⊗	
5才未満		

まとめ

くすり の
薬を飲むときは...

- ・ 飲む時間（用法）を守る
の じかん ようほう まも
- ・ 1回の量（用量）を守る
かい りょう ようりょう まも

くすり の あと
薬を飲んだ後は...

なに へん
何か変だな、いつもとちがうなと

かん
感じることがあったら、大人に相談する
おとな そうだん