

※これは実際にはない薬です。

第2類医薬品

# カゼオクスーリ

**使用上の注意 (薬を飲むときに気をつけること)**

**❌ してはいけないこと**

(守らないと症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- この薬でアレルギーやぜんそくを起こしたことがある人は、この薬を飲まないでください。
- この薬を飲んでいるときは、ほかのかぜ薬を飲まないでください。
- この薬を飲んだ後に眠くなることがあるので、自転車などの乗り物の運転操作をしないでください。



**相談すること**

- 医師の治療を受けている人や、薬などでアレルギーを起こしたことがある人は薬を飲む前に医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。
- この薬を飲んだ後、次の症状があらわれたときは副作用の可能性があるのですぐに飲むのをやめて、医師や薬の専門家(薬剤師、登録販売者)に相談してください。

体の部位	症状
ひふ	かゆみ、ほっしん(ぶつぶつ)
消化器	はきけ、食欲がなくなった

薬を飲むときは、この説明書を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう保存しておいてください。

**効能 (薬の効果)**

かぜの症状(発熱、頭痛、せき、鼻水、くしゃみ、のどの痛み)をやわらげます。



**用法・用量**

年齢	1回に飲む量	用法・用量についての注意
15才以上	3錠	<ul style="list-style-type: none"> <li>1日3回、食後に飲んでください。</li> <li>薬を飲んだ後、次にこの薬を飲むまで4時間以上あけてください。</li> </ul>
7才~14才	2錠	
7才未満	飲まないでください。	

**取りあつかい上の注意**

- 日光の当たらないすずしい場所に置いてください。
- 使用期限をすぎた薬は飲まないでください。

※これは実際にはない薬です。

薬を飲むときは、この説明書を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう保存しておいてください。

第2類医薬品

# イノクスリ



## 使用上の注意（薬を飲むときに気をつけること）

### ❌ してはいけないこと

（守らないと症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

- この薬を飲んでいるときは、ほかの胃腸薬を飲まないでください。
- 長い間使い続けしないでください。



### 相談すること

- 医師の治療を受けている人や、薬などでアレルギーを起こしたことがある人は薬を飲む前に医師や薬の専門家（薬剤師、登録販売者）に相談してください。
- この薬を飲んだ後、次の症状があらわれたときは副作用の可能性があるのですぐに飲むのをやめて、医師や薬の専門家（薬剤師、登録販売者）に相談してください。

体の部位	症状
ひふ	かゆみ、ほっしん（ぶつぶつ）

## 効能（薬の効果）



胃もたれ、食べすぎ、胃痛、食欲がない、はきけをやわらげます。

## 用法・用量

年齢	1回に飲む量	用法・用量についての注意
15才以上	3錠 ⊗ ⊗ ⊗	・1日3回、食前に飲んでください。 ・薬を飲んだ後、次にこの薬を飲むまで4時間以上あけてください。
8才～14才	2錠 ⊗ ⊗	
5才～7才	1錠 ⊗	
5才未満	飲まないでください。	

## 取りあつかい上の注意

- 日光の当たらないすずしい場所に置いてください。
- 使用期限をすぎた薬は飲まないでください。