
性風俗産業に関わる方へ

ただ今、梅毒流行中！
梅毒は感染力が強いです

1回の性行為で梅毒が感染する確率は20~30%と言われています※

女性患者の約4割に性風俗産業従事歴があります

男性患者の約3割に性風俗産業利用歴があります



月に1回
性感染症検査
を受けます
予防も大切、裏面を見てね

保健所・
検査室での検査は
お名前もお金も
保険証も
いりません！

症状があったら
病院へ
行こうね！



薬は
病院で処方されたものを
決められたとおりに飲みましょう
間違った飲み方では、薬が
効かない細菌（耐性菌）ができて、
治りづらくなります

梅毒ってどんな病気？

いろんな症状が出たり消えたり…。
放っておくと重症化します！

0〜3週間 潜伏期間

梅毒感染

3週間



痛みのないあずき大のしこり
（性器・口・足の付け根）、潰瘍
（皮膚がくずれたしこり）

3ヶ月



全身に赤い斑点（バラ疹）
発熱、全身のだるさ、関節痛、手や足の裏の皮むけ、
赤茶色のできもの、いぼ（肛門・性器・わきの下）、
頭のまばらな脱毛、喉の奥の腫れ

約3年

心臓や内臓・骨・神経系にまで
症状が広がり、麻痺が起こったり失明するなど、いろいろな症状が出ます。

症状が出ないこともあります

※文献：Resurgence of Syphilis in the United States:
An Assessment of Contributing Factors -PMCより

性感染症の知識と
病院の情報はこちら
東京都性感染症ナビ

東京都保健医療局

◆編集：一般社団法人住民とともに活動する保健師の会　◆登録番号：(8)52　◆デザイン・イラストレーション制作：井上 麻衣 令和8年7月発行
◆参考：日本性感染症学会梅毒診療ガイドライン　◆監修・写真提供：尾上泰彦（医療法人社団裕志会プライベートケアクリニック東京）　◆監修：渡會睦子（東京医療保健大学）

このような行為から細菌が身体に入っていきます

行為の前後にからだをよく洗いましょう。

うつる・うつす行為

- 膣・肛門(アナル)にペニスを入れるセックス
- フェラチオ・クンニリングス
- アナルなめ
- 顔射・顔面騎乗
- キス
- かむ・かまれる
- ささくれや傷のある指での指入れ



梅毒の細菌がいる場所

- ペニスから出る精液
- 膣から出る膣分泌液
- 血液・体液・だ液

細菌が侵入する場所

- 膣・肛門(アナル)
- 目・口・のど
- 傷口・目に見えない傷ついた皮膚

行為前後のうがい薬・殺菌効果のあるボディソープによる洗浄では、梅毒の予防はできません。

予防と対策

粘膜と皮膚からうつるのを防ぐ

自分の**目・鼻・口・のど・性器・肛門などの粘膜やキズ口**に、相手の血液・膣分泌液・体液・だ液が付かないようにしましょう。

コンドームはフェラチオのときも！

膣・肛門・口のどこに挿入するときも、**感染予防のためにコンドームを着けましょう。**

パートナーも治療をすることが大切！

自分が治療してもパートナーが治療しなければ、パートナーから再感染することがあります。**パートナーと一緒に治療しましょう。**


クンニリングスでもうつる

クンニするときは、**ラップや切り開いたコンドームをあてて**なめるようにしましょう。

東京都ではここ数年で感染者が急増！

東京都における梅毒患者報告数推移

（2015-2025年）



出典：東京都感染症情報センター

検　査

保健所、検査・相談室

東京都 HIV 検査情報Web

検査所が調べられます。

- **匿名・無料**で検査が受けられます。
- **夜間、土曜日・日曜日の検査**もあります。
- 東京都新宿東口検査・相談室は、**水曜日は女性専用の検査日**です。

感染しているかどうかは、血液検査をしないとわかりません。

治　療

薬

大きく２つの方法があります。

- 飲み薬を1 日3 回、4 週間飲みます
- 早期梅毒の場合は、1 回の筋肉注射で治療が完了します
- 健康保険が使えます

病　院

症状があれば、医療機関に行きましょう。

ちゃんと治すためには、検査を受け早く治療を受けることが重要です。

リサイクル適性Ⓐ
この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。