


ただ今、梅毒急増中！ 梅毒は感染力が強いです

1回の性行為で
梅毒が感染する確率は
20~30%
とされています※

女性患者の**約5割**に性風俗産業従事歴があります 男性患者の**約3割**に性風俗産業利用歴があります



月に1回
性感染症検査
を受けます

予防も大切、裏面を見てね



薬は
病院で処方されたものを
決められたとおりに飲みましょう

間違った飲み方では、薬が
効かない細菌(耐性菌)ができて、
治りづらくなります

症状があったら
病院へ
行こうね！

保健所・
検査室での検査は
お名前もお金も
保険証も
いりません！



梅毒ってどんな病気？

いろんな症状が出たり消えたり…。
放っておくと重症化します！

0~3週間
潜伏期間

3週間

3ヶ月

約3年

**梅毒
感染**



痛みのないあずき大のしこり
(性器・口・足の付け根)、潰瘍
(皮膚がくずれたしこり)



全身に赤い斑点(バラ疹)
発熱、全身のだるさ、関節痛、手や足の裏の皮むけ、
赤茶色のできもの、いぼ(肛門・性器・わきの下)、
頭のまばらな脱毛、喉の奥の腫れ

心臓や内臓・骨・神経系にまで
症状が広がり、**麻痺**が起こっ
たり**失明**するなど、いろい
ろな症状が出ます。

症状が出ない
こともあります

※文献: Resurgence of Syphilis in the United States:
An Assessment of Contributing Factors -PMCより

性感染症の知識と
病院の情報はこちら

東京都性感染症ナビ



このような行為から**細菌**が身体に入っていきます 行為の前後にからだをよく洗いましょう。

うつる・うつす行為

- 膣・肛門(アナル)にペニスを入れるセックス
- フェラチオ・クニニリングス
- アナルなめ
- 顔射・顔面騎乗
- キス
- かむ・かまれる
- ささくれや傷のある指での指入れ



梅毒の細菌がいる場所

- ペニスから出る精液
- 膣から出る膣分泌液
- 血液・体液・だ液

細菌が侵入する場所

- 膣・肛門(アナル)
- 目・口・のど
- 傷口・目に見えない傷ついた皮膚

行為前後のうがい薬・殺菌効果のあるボディソープによる洗浄では、梅毒の予防はできません。

粘膜と皮膚からうつるを防ぐ

自分の目・鼻・口・のど・性器・肛門などの粘膜やキズ口に、相手の血液・膣分泌液・体液・だ液が付かないようにしましょう。

コンドームはフェラチオのときも！

膣・肛門・口のどこに挿入するときも、感染予防のためにコンドームを着けましょう。

予防と対策

パートナーも治療をすることが大切！


自分が治療してもパートナーが治療しなければ、パートナーから再感染することがあります。パートナーと一緒に治療しましょう。

クニニリングスでもうつる

クニニするときは、ラップや切り開いたコンドームをあててなめるようにしましょう。

東京都ではここ数年で感染者が急増！

東京都における梅毒患者報告数推移
(2014-2024年)



出典：東京都感染症情報センター

検査

保健所、検査・相談室

東京都 **HIV** 検査情報Web
検査所が調べられます。



- ・匿名・無料で検査が受けられます。
- ・夜間、土曜日・日曜日の検査もあります。
- ・東京都新宿東口検査・相談室は、**水曜日は女性専用の検査日**です。

感染しているかどうかは、血液検査をしないとわかりません。

治療

薬

- 大きく2つの方法があります。
- ・飲み薬を1日3回、4週間飲みます
 - ・早期梅毒の場合は、1回の筋肉注射で治療が完了します
 - ・健康保険が使えます

病院

症状があれば、医療機関に行きましょう。

ちゃんと治すためには、検査を受け早く治療を受けることが重要です。