

別紙 1 乳幼児及び妊婦の緑茶飲料等に関するアンケート調査

乳幼児の緑茶飲料等摂取量(夏季) 1表

	飲料種別	摂取率	乳幼児(0~3歳)			
			最小値 (0mlを除く)	最大値(ml)	平均値 (0mlを除く)	95パーセンタイル (0mlを除く)
自家製	水(湯ざまし含む)	43%	10	1000	241	965
	緑茶	4%	50	600	278	570
	麦茶	66%	10	1000	346	800
	ほうじ茶	9%	20	800	259	735
	玄米茶	0%				
	紅茶	1%	580	580	580	580
	その他のお茶	4%	50	600	257	600
	コーヒー	0%				
	ココア	0%				
	母乳/粉ミルク	39%	100	1500	526	1000
市販品	その他	4%	50	400	212	375
	水	34%	10	1000	224	600
	緑茶	8%	5	300	111	240
	麦茶	33%	10	600	170	450
	ほうじ茶	2%	50	100	66	95
	玄米茶	0%				
	紅茶	0%				
	ブレンド茶	11%	40	550	193	430
	コーヒー	0%				
	ココア	0%				
牛乳/乳飲料	43%	20	800	202	400	
果汁飲料	39%	10	450	123	300	
スポーツ飲料	18%	10	450	186	400	
炭酸飲料	6%	10	1000	242	800	
その他	3%	20	50	37	50	

その他の飲料は、ルイボス茶、イオン水など
最小値・平均値・95パーセンタイルは0mlを除き集計した。(飲用した人数から集計)

2表 (項目は第1表と同じ)

	摂取率	乳幼児(4~6歳)			
		最小値 (0mlを除く)	最大値(ml)	平均値 (0mlを除く)	95パーセンタイル (0mlを除く)
	39%	10	1000	271	500
	8%	40	500	199	800
	78%	50	1500	432	447
	3%	100	500	213	448
	0%				
	3%	30	350	133	313
	8%	40	1000	231	780
	0%				
	3%	50	200	125	200
	2%	200	200	200	200
	2%	100	150	125	148
	38%	20	1200	253	600
	16%	30	1000	205	600
	31%	30	500	142	400
	2%	80	100	90	99
	0%				
	3%	50	500	263	485
	8%	20	600	222	511
	0%				
	1%	20	20	20	20
	68%	40	1000	218	550
	48%	10	800	145	400
	46%	10	600	166	500
	23%	10	400	146	365
	3%	100	300	183	285

3表

	飲料種別	摂取率	妊娠中			
			最小値 (0mlを除く)	最大値(ml)	平均値 (0mlを除く)	95パーセンタイル (0mlを除く)
自家製	水・湯冷まし	26%	80	2000	443	1000
	緑茶	16%	100	1200	342	980
	麦茶	58%	50	2000	505	1000
	ほうじ茶	12%	100	1000	387	740
	玄米茶	2%	50	600	340	550
	紅茶	13%	10	500	207	400
	その他のお茶	11%	30	2000	471	1000
	コーヒー	25%	50	1000	230	600
	ココア	2%	100	400	183	350
	水割り(酒類)	0%				
市販品	その他	4%	200	600	395	600
	ミネラルウォーター	33%	10	1900	337	800
	緑茶	11%	50	600	212	500
	麦茶	28%	30	1500	262	515
	ほうじ茶	7%	30	500	202	500
	玄米茶	3%	100	400	212	382
	紅茶	5%	30	400	190	400
	ブレンド茶	14%	20	1500	253	500
	コーヒー	10%	50	500	202	385
	ココア	2%	100	200	150	200
牛乳、乳飲料	36%	40	1000	215	405	
果汁飲料	19%	40	600	165	322	
スポーツ飲料	8%	50	600	236	595	
炭酸飲料	19%	20	1000	292	500	
アルコール飲料	0%					
市販その他	1%	100	180	143	177	

その他の飲料は、ルイボス茶、イオン水など
最小値・平均値・95パーセンタイルは0mlを除き集計した。(飲用した人数から集計)

4表 お子様へ飲料を与える際、カフェインの有無/含有量について、どの程度意識していましたか。(1つ選択)

全体	た	し	た	た
	識	や	い	い
	と	て	ほ	ま
	し	い	な	な
	て	意	か	か
	い	識	し	し
	意	た	ん	た
	識	識	ど	く
	た	と	ど	く
	く	く	く	く
280	97	103	52	28
100.0	34.6	36.8	18.6	10.0

5表 あなたは妊娠期間中の飲料摂取について、カフェインの有無/含有量について、どの程度意識していましたか。(1つ選択)

全体	た	し	た	た
	識	や	い	い
	と	て	ほ	ま
	し	い	な	な
	て	意	か	か
	い	識	し	し
	意	た	ん	た
	識	識	ど	く
	た	と	ど	く
	く	く	く	く
280	119	117	29	15
100.0	42.5	41.8	10.4	5.4

6表 次にあげる飲料の内、カフェインが含まれていると思うものを、いくつでもお選びください。(複数選択可) 抜粋

全体	緑茶(市販)	麦茶(市販)	ほうじ茶(市販)	玄米茶(市販)	紅茶(市販)	茶ブレンド(市販)	コーヒー(市販)	ココア(市販)
280	211	21	58	85	233	105	259	93
100.0	75.4	7.5	20.7	30.4	83.2	37.5	92.5	33.2

別紙 2 エナジードリンクについてのアンケート調査(抜粋)
 株式会社マーシュ調査 平成25年2月27日現在http://www.marsh-research.co.jp/mini_research/mr201208energy.l

Q3.あなたは、エナジードリンクをどのくらいの頻度で飲んでいらっしゃいますか。(1つ選択)

上段:度数/下段:%		全体	ほぼ毎日	5週日に程4度	3週日に程2度	程週度に1日	3月に程2度	程月に1日	のそ頻れ度以下
全体		519 100.0	12 2.3	14 2.7	51 9.8	64 12.3	78 15.0	94 18.1	206 39.7
性別	男性	318 100.0	6 1.9	10 3.1	32 10.1	42 13.2	47 14.8	64 20.1	117 36.8
	女性	201 100.0	6 3.0	4 2.0	19 9.5	22 10.9	31 15.4	30 14.9	89 44.3
年代別	10代	148 100.0	4 2.7	5 3.4	19 12.8	10 6.8	22 14.9	32 21.6	56 37.8
	20代	161 100.0	4 2.5	2 1.2	17 10.6	27 16.8	30 18.6	25 15.5	56 34.8
	30代	117 100.0	4 3.4	3 2.6	8 6.8	15 12.8	14 12.0	21 17.9	52 44.4
	40代	93 100.0	-	4 4.3	7 7.5	12 12.9	12 12.9	16 17.2	42 45.2

Q4.エナジードリンクを飲まれる際の1日に飲む本数として、あてはまるものをお選びください。(1つ選択)

上段:度数/下段:%		全体	む1本だけ飲	と以だ基も上が本あ飲、はるむ21こ本本	む2ほ本ほ以上回飲
全体		313 100.0	267 85.3	39 12.5	7 2.2
性別	男性	201 100.0	173 86.1	24 11.9	4 2.0
	女性	112 100.0	94 83.9	15 13.4	3 2.7
年代別	10代	92 100.0	82 89.1	9 9.8	1 1.1
	20代	105 100.0	84 80.0	18 17.1	3 2.9
	30代	65 100.0	55 84.6	7 10.8	3 4.6
	40代	51 100.0	46 90.2	5 9.8	-