




麻疹（はしか）にならない、麻疹にしない



麻疹ウイルス
東京都健康安全
研究センターHP から



8月4日は「はしか予防」の日



麻疹（はしか）は感染症です

麻疹は麻疹ウイルスによる感染症です。国内発生は予防接種の徹底により激減し、2015年3月にWHOは、日本が麻疹の排除状態にあると認定しました。しかし近年は、輸入例（日本人海外渡航者もしくは流行国から来日した渡航者）がきっかけとなり、感染が広がる例がありました。

感染経路は「空気感染」、「飛まつ感染」、「接触感染」でヒトからヒトへうつります。発症した人が周囲に感染させる期間は、発熱の前日から発疹出現後 4～5 日くらいまでです。感染力は極めて強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100% かかりますが、一度感染して発病すると一生免疫が持続します。



「学校における麻疹対応ガイドライン」から
https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/school_201802.pdf

病気の予防

- 有効な予防法は予防接種で、麻疹に対する免疫が獲得でき、発症リスクを抑えられます。
- 1回の摂取では十分免疫がつかなかった人も、2回予防接種することで、免疫をつけられます。
- 海外へ行く予定がある方は、予防接種が必要な医師に相談しましょう。



麻疹が疑われて医療機関へ受診するとき

麻疹患者と接触した後に、発熱や咳、鼻汁、目やにが出る、発疹などの症状で、麻疹が疑われる場合は、**事前に医療機関にそのことを電話で連絡してから**受診してください。



麻疹について もっと知りたい場合

- ⇒ 麻疹の流行情報は
- ⇒ 麻疹についての情報は
- ⇒ 海外渡航のためのワクチン

【この記事に関するお問い合わせ】 保健対策課 感染症対策担当

このマークは、目の不自由な方などのための「音声コード」で、コードの位置を示すために切り込みを入れてあります。専門の読み上げ装置で読み取ると、記事内容を音声で聞くことができます。

